

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 28-3-72 294065

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : ~~24 numéros par an~~

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE

ABONNEMENT ANNUEL

ET FRANCHE-COMTÉ - 21, route de Seurre - 21 BEAUNE - Tél. 5.17 et 9.57

25 F.

COTE-D'OR - DOUBS - HAUTE-SAONE - JURA - SAONE-&-LOIRE - TERRITOIRE DE BELFORT - YONNE - NIÈVRE

Régisseur de recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture - C. C. P. DIJON 3403.12 K

Bulletin n° 138 - Supplément n° 3 - MARS 1972

27 MARS 1972

## V I G N E

NOCTUELLES (VERS GRIS) : Dès la constatation des premiers dégâts, appliquer un traitement d'appâts (mélange de son et insecticide). Il existe des spécialités commerciales prêtes à l'emploi. Dose : 80 Kgs/hectare ; en répandre en petits tas au pied des souches. Les maintenir humides.

OTIORRHYNQUES - PERITELES : Dès l'observation des premiers dégâts sur bourgeons, effectuer un poudrage de préférence.

## ARBRES FRUITIERS

TAVELURES DU POIRIER ET DU POMMIER : Une première projection d'ascospores de la tavelure du poirier vient de se produire, il y a lieu de craindre que des contaminations ne soient possibles dès la prochaine série de pluies. Il convient donc de faire une première application généralisée pour les arbres qui n'ont pas encore été protégés et qui arrivent aux stades de préfloraison en utilisant une bouillie cuprique, 500 g. de cuivre métal/hectolitre de bouillie.

Cette préparation est également efficace contre les maladies bactériennes des poiriers et les chancres.

OIDIUM DU POMMIER : Eliminer les pousses oïdiées qui sont déjà bien visibles et ajouter à la bouillie anti-tavelure un fongicide anti-oïdium.

TEIGNE DES FLEURS DU CERISIER (Région de FOUGEROLLES) : Nous rappelons notre bulletin n° 138 - Supplément 2.

## PETITS FRUITS

GROSEILLIER - CASSISSIER : ANTHRACNOSE : Un premier traitement est préconisé avec un fongicide : mancozèbe à 160 g. de matière active/hectolitre ou une bouillie cuprique à 150 g. de cuivre métal.

CHEMILLES DEFOLIATRICES : On peut éventuellement ajouter à la préparation ci-dessus un organo-phosphoré : parathion ou phosalone aux doses préconisées par les fabricants.

Nous rappelons toutefois que les traitements insecticides ne doivent pas être systématiques et que leurs emplois ne se justifient qu'après un contrôle sérieux de la présence des ravageurs ou de leurs dommages.

FRAMBOISIERS : OTIORRHYNQUES, PERITELES : La destruction des bourgeons par ces gros charançons cachés le jour au pied des touffes et opérant la nuit est assez fréquente dans les plantations. Une application copieuse de lindane ou d'organo-phosphoré est justifiée dans les parcelles contaminées.

PROTECTION DES ABEILLES : Rappel de notre dernier bulletin n° 138 - Supplément 2.

Dernière note : Bulletin n° 138 - Supplément n° 2

Les Ingénieurs chargés  
des Avertissements Agricoles :

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie,  
Chef de la Circonscription phytosanitaire  
de "Bourgogne et Franche-Comté" :

J. PETIOT - H. TISSOT.

G. VARLET

P 371